

Riskläkemedel till äldre

Användning av dessa läkemedel leder i hög grad till biverkningar. Nyttan av behandlingen ska vägas mot riskerna.

Kom ihåg!

- Stäm av all läkemedelsbehandling regelbundet med patienten.
- Utvärdera och ompröva all läkemedelsbehandling regelbundet.

Tänk läkemedelsbiverkan vid: Försämrat allmäntillstånd, fall, förvirring och förändrade fysiologiska värden.

Substans	Preparatexempel	Risker
Tramadol	Tramadol, Tradolan, Nobligan, Tiparol, Gemadol	Illamående, yrsel, konfusion, trappas ut.
Propiomazin	Propavan	Dagtrötthet, stelhet, gångstörning, restless legs.
Bensodiazepiner med långverkande effekt: diazepam, nitrazepam, flunitrazepam	Diazepam, Stesolid Nitrazepam, Mogadon Flunitrazepam	Dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet, balansstörningar, trappas ut.
Läkemedel med betydande antikolinerga effekter, exempel: tolterodin, solifenacin, hydroxizin, amitriptylin, prometazin, alimemazin	Detrusitol, Vesicare Atarax, Saroten, Lergigan, Theralen	Kognitiv nedsättning, akut konfusion, urinretention, obstipation, muntorrhet som kan ge tandproblem.