

Bedömning och vaccination när dokumentation är osäker eller saknas

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att asylsökande från Syrien, Afghanistan, Irak och Ukraina erbjuds vaccination redan vid första vårdkontakten.

Ålder	Rekommendation
0 – 5 mån	Erbjud tidigast vid 2,5 månaders ålder: Hexyon® och Synflorix®
Från 6 – 12 mån	Erbjud vid första besöket: Hexyon® och Synflorix®
Från 1 år till <6 år	Erbjud vid första besöket: Hexyon® och Synflorix®, samt M-M-RVAXPRO® från 1 års ålder
Från 6 år – 18 år	Erbjud vid första besöket: Tetravac® + Engerix-B®, eller Hexyon® enbart, samt M-M-RVAXPRO ® IGRA/ PPD test kan utföras 4 veckor efter MPR-vaccination. Alternativt: Om PPD- eller IGRA-test sätts/tas först så kan MPR ges därefter utan särskilt intervall.

Läs hela dokumentet om Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande vaccinationer till människor på flykt.

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2c0a3cd820564fefa79435aa570d678b/vaccinationer-till-manniskor-pa-flykt.pdf>