

Parodontal operation med regenerativ åtgärd

- Sköljning med klorhexidin, 2 mg/ml 2 gånger/dag under en hel minut.
- Ingen tandborstning eller approximal rengöring i operationsområdet innan suturerna avlägsnats.
- Icke opererade tänder borstas med tandkräm som inte innehåller natriumlaurylsulfat.

2 veckor efter operation

- Avlägsna suturer.
- Läkningskontroll.
- Avlägsna varsamt eventuell plack i operationsområdet.
- Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
- Mobila tänder kan behöva fixeras.
- Behandla känsliga tandhalsar med lämpligt fluorpreparat.
- Postoperativkontroll bör ske var 14:e dag fram till 3-månader efter operation.
- Fortsatt sköljning med klorhexidin, 2 mg/ml 10 ml 2 gånger/dag under en hel minut, ytterligare 4 veckor.

6 veckor efter operation

- Läkningskontroll
- Infärgning för plackkontroll.
- Påvisa eventuella plackytor och instruera/motivera patienten till att upprätthålla en optimal munhygien.
- Instruera/motivera i väl anpassade approximala hjälpmedel.
- Komplettera med eventuellt enbindelsborste vid behov för att nå axiala vinklar palatinalt/lingualt.

Låt patienten träna själv!

- Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
- Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
- Avlägsna missfärgningar, använd Air-Flow vid behov.
- Behandla känsliga tandhalsar med lämpligt fluorpreparat.
- Klorhexidinsköljning fortsättningsvis efter individuella behov
- Ingen fickmätning i operationsområdet!

3 månader efter operation

- Infärgning för plackkontroll.
- Påvisa eventuella plackytor och instruera/motivera patienten till att upprätthålla en optimal munhygien.
- Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
- Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
- Avlägsna missfärgningar, använd Air-Flow vid behov.
- Sätt in daglig sköljning med 0,2 % natriumfluoridlösning.
- Ingen fickmätning i operationsområdet!

6 och 9 månader efter operation

- Infärgning för plackkontroll.
- Påvisa eventuella plackytor och instruera/motivera patienten till att upprätthålla en optimal munhygien.
- Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
- Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
- Ingen fickmätning i operationsområdet!

12 månader efter operation - utvärdering

- 1-års utvärdering sker vanligtvis på Specialisttandvården

Innefattar registrering av:

- Uppdatering hälsodeklaration
- Kontroll av munslemhinnor
- Plackregistrering (Viktig värdeområde för att motivera patienten med tanke på att denna patientgrupp är betydligt känsligare för plack än normalindivid).
- Nytt fullständigt fickstatus (Vi mäter 6 punkter, registrerar 4).
- BoP, blödning vid sondering
- Pusförekomst
- Furkationsinvolvering
- Mobilitet
- Röntgen, fyra stående bitewing är standard, samt apikala röntgen på opererade tänder med regenerativ kirurgi. Övriga röntgen vid behov.

Sjukdomsvärdering:

Sammanställning av aktuella data, utifrån dessa bedöms det framtida behandlingsbehovet.